

Гинекологическая патология

Показания к применению:

- аменорея,
- дисменорея,
- бесплодие,
- профилактика,
- полипы гинекологической сферы,
- эрозия шейки матки,
- кисты яичников,
- миома матки,
- эндометриоз,
- вагиниты, вагинозы, неспецифические кольпиты,
- хламидиоз, герпес, цитомегаловирус.

Схема приема БАД «Флоравит Э» при гинекологической патологии

| Раствор | Время приема | 1-я неделя | 2-я неделя и далее |
|----------|----------------------------|------------------|--------------------|
| Масляный | За 15-20 минут до завтрака | 1/2 чайной ложки | 1 чайная ложка |
| Водный | За 15-20 минут до ужина | 1 столовая ложка | 3 столовых ложки |

Минимальный курс 2 месяца 2 раза в год.

При **хламидиозе, герпесе, цитомегаловирусе** – циклами по 2 месяца с месячным перерывом – 1 год.

При **грибковом вагините**- курсами по 1 месяцу с месячным перерывом в общей сложности 8 месяцев.

Особенности применения

Лицам, страдающим **желчно-каменной болезнью** масляный раствор «Флоравит Э» назначается во время завтрака.

При **гипертонической болезни 2ст.**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, 2-я неделя – 10 капель, с 3-й недели повышать до 1 чайной ложки. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

При **гипертонической болезни 3ст. и хронической сердечной недостаточности**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, с 2-ой недели – 10 капель. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

Лицам старше 70 лет рекомендуется принимать половинные дозы растворов «Флоравит Э».

Местное воздействие при **вагинитах**

Вагинит бактериальный:

На протяжении дня – тампоны с масляным раствором, разведенным в 4 раза кипяченой водой – 2 недели.

На ночь – гиналгин 1 таблетка заводится непосредственно во влагалище на ночь – 1 неделя.

Вагинит грибковый:

Местно – тампоны с водным раствором «Флоравит Э» на 40 минут 2 – 3 раза в сутки. Внутрь добавляются противогрибковые препараты (дифлюкан).