

Острые токсические гепатиты (в т. ч. алкогольные)

С целью профилактики развития **острого токсического (алкогольного) гепатита** показан прием БАД «Флоравит Э» внутрь по схеме:

1/2 чайной ложки масляного раствора и 3 столовых ложки водного раствора за 15 минут до предполагаемого обильного принятия пищи и алкоголя и сразу после него.

В случае уже развившегося токсического (алкогольного) гепатита БАД «Флоравит Э» (водный и масляный растворы) принимать внутрь в составе комплексной дезинтоксикационной терапии по стандартной схеме, и, естественно, исключив прием алкоголя, курсом - 1,5 месяца.

Лицам, страдающим **желчно-каменной болезнью** масляный раствор «Флоравит Э» назначается во время завтрака.

При гипертонической болезни 2ст., масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, 2-я неделя – 10 капель, с 3-й недели повышать до 1 чайной ложки. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

При гипертонической болезни 3ст. и хронической сердечной недостаточности, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, с 2-ой недели – 10 капель. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

Лицам старше 70 лет рекомендуется принимать половинные дозы растворов «Флоравит Э».