

Трофические язвы

Трофические язвы развиваются в результате хронической артериальной недостаточности нижних конечностей на фоне атеросклероза сосудов нижних конечностей, облитерирующего эндартериита, «диабетической стопы»; а также при хронической венозной недостаточности на фоне варикозной болезни вен нижних конечностей, посттромбофлебитического синдрома. Предвестниками появления трофических язв могут быть темные слияные пигментные пятна на нижней трети голени.

При хронической артериальной или венозной недостаточности, применение **БАД «Флоравит Э»** внутрь по стандартной схеме показано с целью повышения эластичности внутренней оболочки сосудов, препятствия тромбообразования, улучшения реологических свойств крови, улучшения микроциркуляции, регенерации и уменьшения воспалительных явлений.

Помимо приема водного и масляного растворов внутрь по стандартной схеме, необходимо нанесение кремов - [комфорт для ног](#) или [«Таис славянская»](#) – от кончиков пальцев ног до паховой складки со всех сторон легкими поглаживающими движениями снизу вверх, исключая зону язвы. Не массировать! Не втирать! 1 – 2 раза в день.

Непосредственно на язву:

При мокнущей поверхности – после предварительной обработки поверхности язвы 1% раствором перекиси водорода накладывать примочки с водным раствором Флоравит 5-6 раз в день на 1час.

При «сухой» язве – мазевые повязки с [кремом «Таис славянская»](#). Менять 2 раза в сутки.

Особенности применения

Лицам, страдающим **желчно-каменной болезнью** масляный раствор «Флоравит Э» назначается во время завтрака.

При **гипертонической болезни 2ст.**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, 2-я неделя – 10 капель, с 3-й недели повышать до 1 чайной ложки. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

При **гипертонической болезни 3ст. и хронической сердечной недостаточности**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, с 2-ой недели – 10 капель. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

Лицам старше 70 лет рекомендуется принимать половинные дозы растворов «Флоравит Э».