

Хронический пиелонефрит и хронический гломерулонефрит

Схема приема БАД «Флоравит Э» при хроническом бескаменном пиелонефрите и хроническом гломерулонефрите

Раствор	Время приема	1-я неделя	2-я – 8-я неделя
Масляный	За 15 мин до еды 2 раза в день	1/2 чайной ложки	1 чайная ложка
Водный	За 15 мин до еды 2 раза в день	1 столовая ложка	1 столовая ложка

Растворы «Флоравит Э» принимаются вместе за 15 мин до завтрака и до ужина. Перед употреблением хорошо встряхнуть. Прием препаратов «Флоравит Э» (водного и масляного растворов) является надежной профилактикой развития мочекаменной болезни.

Особенности применения

Лицам, страдающим **желчно-каменной болезнью** масляный раствор «Флоравит Э» назначается во время завтрака.

При **гипертонической болезни 2ст.**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, 2-я неделя – 10 капель, с 3-й недели повышать до 1 чайной ложки. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

При **гипертонической болезни 3ст. и хронической сердечной недостаточности**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, с 2-ой недели – 10 капель. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

Лицам старше 70 лет рекомендуется принимать половинные дозы растворов «Флоравит Э».