

Хроническая венозная недостаточность, при варикозной болезни вен нижних конечностей, посттромбофлебитическом синдроме

При хронической венозной недостаточности применение БАД «Флоравит Э» внутрь по стандартной схеме показано с целью препятствия тромбообразования, улучшения реологических свойств крови, улучшения микроциркуляции, уменьшения воспалительных явлений.

Помимо приема водного и масляного растворов внутрь по стандартной схеме, рекомендуется нанесение кремов – [«Флоравит комфорт для ног»](#) или [«Таис славянская»](#) – с целью повышения венозного тонуса, улучшения венозного оттока и лимфатического дренажа, а также для достижения местного обезболивающего, противовоспалительного, противосудорожного и регенерирующего эффектов. Кремы наносятся от кончиков пальцев ног до паховой складки со всех сторон легкими поглаживающими движениями снизу вверх. Не массировать! Не втирать! 1 – 2 раза в день. Оптимальный вариант использования кремов: утром и в течении дня – крем «Флоравит комфорт для ног», вечером – «Таис славянская».

При наличии трофических язв – см.раздел [тrophicеские язвы](#).

Особенности применения

Лицам, страдающим **желчно-каменной болезнью** масляный раствор «Флоравит Э» назначается во время завтрака.

При **гипертонической болезни 2 ст.**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, 2-я неделя – 10 капель, с 3-й недели повышать до 1 чайной ложки. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме

При **гипертонической болезни 3 ст. и хронической сердечной недостаточности**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, с 2-ой недели – 10 капель. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

Лицам старше 70 лет рекомендуется принимать половинные дозы растворов «Флоравит Э».