

Профилактика осложнений беременности и послеродового периода

Введение БАД «Флоравит Э» в программу подготовки беременных к родам позволяет:

1. улучшить психо-эмоциональное состояние беременных,
2. восстановить моторику желчного пузыря и кишечника,
3. улучшить состояние микроэкологии кишечника,
4. снизить риск развития инфицированности у матери и новорожденных,
5. повысить адаптационные процессы беременности и родов,
6. снизить риск развитие гестозов и нарушений родовой деятельности.

Схема приема биодобавки «Флоравит Э» во время неосложненной беременности и в послеродовом периоде.

Раствор	12-23 недели беременности	24-31 недели беременности	34-40 недели беременности	Послеродовой период до 40 дня
Водный	По 2 столовых ложки за 15-20 минут до завтрака	2 столовых ложки за 15-20 минут до завтрака	2 столовых ложки за 15-20 минут до завтрака	2 столовых ложки за 15-20 минут до завтрака
Масляный	Не принимать	1/2 чайной ложки за 15-20 минут до ужина	1/2 чайной ложки за 15-20 минут до ужина	1 чайная ложка за 15-20 минут до ужина

В начале приема в течение одной недели принимать половинные дозы.

Молочные железы, подключичные области 2-3 раза в день обрабатывать тонким слоем крема [«Таис славянская»](#) или [кремом для лица и шеи «Флоравит»](#).

При осложнениях беременности доза водного раствора увеличивается до 50 мл.

Особенности применения

Лицам, страдающим **желчно-каменной болезнью** масляный раствор «Флоравит Э» назначается во время завтрака.

При **гипертонической болезни 2ст.**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, 2-я неделя – 10 капель, с 3-й недели повышать до 1 чайной ложки. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

При **гипертонической болезни 3ст. и хронической сердечной недостаточности**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, с 2-ой недели – 10 капель. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.