

Вирусные гепатиты («В», «С»), гепатозы (в т.ч. жировая дистрофия печени), фиброз и цирроз печени

Прием препаратов «Флоравит Э» (водного и масляного растворов) показан:

- при профилактике иммунодефицита,
- в комплексной терапии острых гепатитов,
- в комплексной терапии хронических активных гепатитов,
- с целью удлинения фазы ремиссии хронических гепатитов,
- при профилактике развития фиброза и цирроза печени после перенесенного острого гепатита и при наличии хронического активного гепатита,
- при профилактике развития печеночно-клеточного рака (особенно при гепатите «С»),
- в комплексной терапии при развившейся печеночной недостаточности на фоне фиброза, цирроза печени, гепатоза с целью остановки прогрессирования процесса и продления жизни больного.

Принимать препараты «Флоравит Э» (водный и масляный растворы) необходимо циклами по 2 месяца с месячным перерывом на протяжении одного года. В случае активного вирусного гепатита (в биохимическом анализе крови повышено содержание АСТ, АЛТ, ЩФ) первый цикл может продолжаться 4 - 6 месяцев.

Раствор	Время приема	1-я неделя	2-я неделя и далее
Водный	За 15-20 минут до завтрака	1 столовая ложка	2 столовых ложки
Масляный	За 15-20 минут до ужина	1/2чайной ложки	1 чайная ложка

Особенности применения

Лицам, страдающим **желчно-каменной болезнью** масляный раствор «Флоравит Э» назначается во время завтрака.

При **гипертонической болезни 2ст.**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, 2-я неделя – 10 капель, с 3-й недели повышать до 1 чайной ложки. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

При **гипертонической болезни 3ст. и хронической сердечной недостаточности**, масляный раствор назначается: 1-я неделя – 5 капель, с 2-ой недели – 10 капель. Прием водного раствора «Флоравит Э» по стандартной схеме.

Лицам старше 70 лет рекомендуется принимать половинные дозы растворов «Флоравит Э».